Kinpeygo®:

Neue Perspektiven bei IgA-Nephropathie

Die erste und einzige von der EMA zugelassene
Therapie speziell für IgA-Nephropathie^{1,*}

Jetzt mehr erfahren!
igan.stada

**Kinpeygo 4 mg Hartkapseln
m. veränd. Wirkst.-Frs.
PZN 17623751**

Kinpeygo® wirkt am primären Entstehungsort der IgA-Nephropathie^{2,*}

MoA

Zielgerichtete Freisetzung von Budesonid zur Hemmung der IgA1-Synthese am primären Entstehungsort bei IgAN²

UPCR

48 % stärkere Reduktion Kinpeygo® vs. Placebo nach 12 Monaten in der Gesamtpublikation^{1,*}

eGFR

Verbessert nach 12 Monaten unter Kinpeygo® vs. Placebo bei Patienten mit einer UPCR $\geq 1,5$ g/g (9,31 ml/min/1,73 m²)¹

Sicherheit

Allgemein gute Verträglichkeit der 9-monatigen Behandlung bei primärer IgAN¹

* Kinpeygo® ist zur Behandlung von primärer Immunglobulin A (IgA)-Nephropathie (IgAN) bei Erwachsenen mit einem Risiko für eine rasche Krankheitsprogression mit einer Protein/Kreatinin-Ratio im Urin (UPCR) von $\geq 1,5$ g/Gramm angezeigt.¹

eGFR: geschätzte glomeruläre Filtrationsrate **IgA:** Immunglobulin A **IgAN:** Immunglobulin-A-Nephropathie **MoA:** Mode of Action **PZN:** Pharmazentralnummer **UPCR:** Protein-Kreatinin-Quotient im Urin

1 Summary of Product Characteristics Kinpeygo® 4 mg Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung, Stand 07/22.

2 Fellström BC et al. Targeted-release budesonide versus placebo in patients with IgA nephropathy (NEFIGAN): a double-blind, randomised, placebo-controlled phase 2b trial. Lancet 2017; 389(10084): 2117-2127.

Kinpeygo® 4 mg Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung Wirkstoff: Budesonid. **Zus.:** 1 Hartkaps. m. veränd. Wirkstofffreisetzung. enth. 4 mg Budesonid. **Sonst. Bestandt.:** Zucker-Stärke-Pellets, Hypromellose, Macrogol, Citronensäure-Monohydrat, Ethylcellulose, mittelkett. Triglyceride, Ölsäure, Titandioxid (E171), Poly(methacrylsäure-co-methylmethacrylat), Talkum, Dibutyldecandioat, Schellack, Eisen(II,III)-oxid (E172). **Anw.:** Behandl. v. prim. Immunglobulin A (IgA)-Nephropathie (IgAN) b. Erw. m. e. Risiko f. e. rasche Krankheitsprogress. m. e. Protein/Kreatinin-Ratio i. Urin (UPCR) v. $\geq 1,5$ g/Gramm. **Gegenanz.:** Überempf. gg. d. Wirkst. od. e. d. sonst. Bestandt.; schwere Leberfunkt.stör. (Child-Pugh-Klasse C). **Schwangersch./Stillz.:** Nur nach sorgfält. Nutzen-Risiko-Abwäg. **NW:** Sympt. d. Cushing-Syndr., Diab. mell., verschwomm. Sehen, Hypertonie, Dyspepsie, Hautreakt. (Akne, Dermatitis), Muskelspasmen, periph. Ödem, Gewichtszunahme, Gesichtssöd. u. Dyspepsie; NW system. Glucocorticoide z.B. erhöhter Blutdruck, erhöhtes Infektionsrisiko, verzög. Wundheil., verring. Glukosetoler., Natriumretent. m. Ödembild., Muskelschwäche, Osteoporose, Glaukom, psych. Erkrank., pept. Ulzera, erhöhtes Thromboserisiko. **Warnhinw.:** Enthält Saccharose. Angaben gekürzt - weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte d. Fach- bzw. Gebrauchsinformation. Verschreibungspflichtig. Zulassungsinhaber: STADA Arzneimittel AG, Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel Örtlicher Vertreter: STADAPHARM GmbH, Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel Stand: Juni 2022

STADAPHARM GmbH
Stadastraße 2-18
61118 Bad Vilbel

Caring for People's Health www.stadapharm.de

STADA

STADAPHARM